アミノグリコシド系抗菌薬

名前の共通性
○○○マイシン、○○○シン

原核生物のリボソームに作用（コドンの誤読、合成阻害）
殺菌的に作用 濃度依存的に効果を発揮
βラクタム系との併用で相乗効果あり
腎排泄型

しかし 毒性が高い → TDM
副作用：腎毒性、第八脳神経障害（難聴、平行障害）
増強
ループ系利尿薬やバンコマイシンの併用

耐性機構

アセチル化、リン酸化、アデニル化（←薬剤の修飾）
リボソームの変異（←薬剤標的の変化）

マクロライド系抗菌薬

名前の共通性
○○○マイシン 苦味がある→シロップと混ぜる

グラム陰性菌には大型なためにの外膜のポーリンを通過できず無効

リボソームの50sサブユニットに結合 → タンパク質合成阻害
細胞壁が無い菌=βラクタム系無効
副作用が非常に少ない → 小児にも利用可（小児のマイコプラズマ肺炎の第一選択薬）
代謝産物がP450-CYP3A4を阻害 → 併用薬の血中濃度が上昇←注意必要
時間依存的に作用 静菌的に作用する

慢性気道感染症（びまん性汎細気管支炎、慢性副鼻腔炎（蓄膿症）の治療
1/2量を6~24ヶ月投与（長期少量投与療法）

14員環マクロライド

エリスロマイシン 脂溶性→細胞内移行性が高い 肺への移行性高い
クラリスロマイシン ピロリ菌の除菌
ロキシスロマイシン

マイコプラズマ肺炎
レジオネラ肺炎
クラミジア
ジフテリア
百日咳
細胞内寄生菌
耐性機構
リボソームの変異（←薬剤標的の変化）

15員環マクロライド

商品名：ジスロマック

アジスロマイシン インフルエンザ菌、クラミジアに使用、半減期が長い（68時間）→3日投与で7日効果持続（ローディングドーズ）

16員環マクロライド

キササマイシン、ジョサマイシン、ロキサマイシン、ミデカマイシン、スピラマイシン

テトラサイクリン系抗菌薬

名前の共通性
○○○サイクリン テトラサイクリン、ミノサイクリン、ドキシサイクリン

リボソームの30Sサブユニットに結合 → リボソームにアミノアシルtRNAが結合するのを阻害 ← 静菌的に作用

広域抗生物質 → 菌交代症

グラム陽性菌、グラム陰性菌（緑膿菌を除く）に有効 特にクラミジア感染症、リケッチア感染症、マイコプラズマ肺炎に用いられる

金属イオンとキレート形成→吸収されない

制酸剤・胃腸薬（pH上昇、Al³⁺、Mg²⁺）

2時間あける

牛乳（Ca²⁺）、鉄剤との同時服用はダメ

副作用：歯牙黄染 Caとキレートを形成するため骨や歯が黄色くなる。特に発達段階の乳幼児や小児には使用を避ける。

耐性機構：テトラサイクリン排出ポンプ

4個の六員環が結合した構造を持つ黄色い薬剤

クロラムフェニコール系抗菌薬

クロラムフェニコール

リボソームの50Sサブユニットに結合 → ペプチジルトランスフェラーゼ（ペプチド転移反応）を阻害

グラム陽性、陰性にかかわらず、多くの微生物に対して有効 ← 静菌的に作用する

副作用：再生不良性貧血、グレー症候群

重大な副作用である → 腸チフスなど重大で生命の危機がある感染症にのみ用いられる

耐性機構：クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ = CAT（クロラムフェニコールをアセチル化する）

分子内に2個の不斉炭素を持ち、4つの光学異性体があるが、抗菌活性があるのはそのうちの1つである。
全合成可能。

オキサゾリジノン系抗菌薬

リネゾリド

リボソームの50sサブユニットと30sサブユニットとmRNAが複合体を形成するのを阻害する。

抗VRE薬、抗MRSA薬

耐性機構 リボソームの変異（←薬剤標的の変化）

経口吸収が非常に高い バイオアベイラビリティが100%に近い

ムピロシン

イソイシル-tRNA合成酵素阻害 → イソイシル-tRNAができない→翻訳が途中で終わってしまう。

鼻腔内のMRSAの除菌に用いられる ← 商品名：バクトロバン難航